



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Informace z 5. hemofilického dne

s mezinárodní účastí

- Pokroky v léčbě hemofilie
- Profylaktická léčba

- Doporučené dávky, pooperační terapie

- Imunotoleranční léčba u pacientů s inhibítorem
- Kazuistiky: úspěšnost u 75 % pacientů
- Kdy zahájit léčbu a do kdy / do jaké hladiny / léčit

- Význam profylaktické léčby hemofilie v prevenci artropatie a vzniku inhibitorů
- Jednoznačná přednost profylaxe proti léčbě on demand v prevenci spontánního krvácení a vzniku hemofilické artropatie u dětí.

- Profylaxe zahájená včas, je ochranou před vznikem inhibitorů
- Primární profylaxe-léčba zahájená před 2. rokem života, tedy před a nebo při prvním krvácení do kloubu
- Sekundární profylaxe se začíná po 2. roce života, tedy po 2. krvácení do kloubů

- Profylaxe v dospělém věku:
- krátkodobá
- intermitentní
- Studie jednoznačně potvrdily efekt profylaxe
 - snížená frekvence krvácení
 - zlepšení kvality života

- Profylaktické zkušenosti s
- Zkušenosti se sekundární profylaxí u pacientů s hemofilií
/dlouhodobá, krátkodobá, intermitentní/

- Informace o letních pobytech pro malé děti s hemofilií
- Od roku 2011 vzniklo sdružení, které pravidelně organizuje Letní tábory pro malé děti s rodiči
- Výhoda zapojení i starších dětí, výměna zkušeností rodičů

- Kazuistiky: chirurgické a ortopedické operace hemofilických pacientů s úrazy HKK a DKK a nutná substituce FVIII.

- Chronická bolest u pacientů s hemofilií
- analgetika používaná při různých stupních bolestí
- Doporučení prezentovaná v časopise Hemofilie